


## FOLFOX+アバスチン (B-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

### ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																		
		1	2	3	4	5	6	7	...	...	14	1	2	3	4	5	6	7	...	...
アバスチン	点滴																			
オキサリプラチン	点滴																			
レボホリナート	点滴																			
5-FU	静注																			
5-FU	点滴																			



1クールの日数	14日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	初回90分 以後60分→30分 全量100mLに調製 *ブドウ糖溶液との配合×	1
	アバスチン	5mg/kg			
3	5%糖液	250mL	点滴	並行投与 120分 メイン：オキサリプラチン *生食との配合× 側管：レボホリナート	1
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>			
	5%糖液	250mL	点滴		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>			
4	5%糖液 or 生食	50mL	急速静注	15分	1
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>			
5	5%糖液 or 生食	適量	持続点滴	46時間持続	1-2
	5-FU	2.4~3.0g/m <sup>2</sup>			

### ◆催吐リスク： 中等度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延
- ・オキサリプラチン：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、アレルギー反応、視覚障害、間質性肺炎
- ・5-FU：下痢、口内炎、骨髄抑制、心筋虚血、手足症候群

### ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社