


FOLFOX+ベクティビックス (P-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん (KRAS遺伝子野生型)

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																		
		1	2	3	4	5	6	7	14	1	2	3	4	5	6	7
ベクティビックス	点滴																			
オキサリプラチン	点滴																			
レボホリナート	点滴																			
5-FU	静注																			
5-FU	点滴																			



1クールの日数	14日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	60分 全量100mLに調製 *フィルター付輸液セット使用	1
	ベクティビックス	6mg/kg			
3	5%糖液	250mL	点滴	並行投与 120分 メイン：オキサリプラチン *生食との配合× 側管：レボホリナート	1
	オキサリプラチン	85mg/m ²			
	5%糖液	250mL	点滴		
4	レボホリナート	200mg/m ²			
	5%糖液 or 生食	50mL	急速静注	15分	1
5	5-FU	400mg/m ²			
	5%糖液 or 生食 5-FU	適量 2.4~3.0g/m ²	持続点滴	46時間持続	1-2

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・ベクティビックス：皮疹、皮膚障害、痒痒、爪囲炎、低Mg血症、下痢、間質性肺炎、インフュージョンリアクション
- ・オキサリプラチン：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、アレルギー反応、視覚障害、間質性肺炎
- ・5-FU：下痢、口内炎、骨髄抑制、心筋虚血、手足症候群

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社