


FOLFIRI

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																		
		1	2	3	4	5	6	7	14	1	2	3	4	5	6	7
イリノテカン	点滴																			
レボホリナート	点滴																			
5-FU	静注																			
5-FU	点滴																			



1クールの日数	14日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロロン	3.8mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	並行投与 120分 メイン：イリノテカン 側管：レボホリナート	1
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴		
	生食	250mL			
レボホリナート	200mg/m ²				
3	5%糖液 or 生食	50mL	急速静注	15分	1
	5-FU	400mg/m ²			
4	5%糖液 or 生食	適量	持続点滴	46時間持続	1-2
	5-FU	2.4~3.0g/m ²			

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・イリノテカン：骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、間質性肺炎
- ・5-FU：下痢、口内炎、骨髄抑制、心筋虚血、手足症候群

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社