


## FOLFIRI+アービタックス (C-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

### ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	...	14	1	2	3	4	5	6	7	8	...
アービタックス	点滴																			
イリノテカン	点滴																			
レボホリナート	点滴																			
5-FU	静注																			
5-FU	点滴																			



1クールの日数	14日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1, 8
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
	ポララミン	5mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	初回120分 以降60分  全量250mLに調製	1, 8
	アービタックス	初回400mg/m <sup>2</sup> 以降250mg/m <sup>2</sup>			
3	生食	250mL	点滴	並行投与 120分  メイン：イリノテカン 側管：レボホリナート	1
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴		
	生食	250mL			
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>			
4	5%糖液 or 生食	50mL	急速静注	15分	1
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>			
5	5%糖液 or 生食	適量	持続点滴	46時間持続	1-2
	5-FU	2.4~3.0g/m <sup>2</sup>			

### ◆催吐リスク： 中等度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・アービタックス：皮疹、皮膚障害、痒痒、爪囲炎、下痢、低Mg血症、インフュージョンリアクション、心障害
- ・イリノテカン：骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、間質性肺炎
- ・5-FU：下痢、口内炎、骨髄抑制、心筋虚血、手足症候群

### ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社