


SOX

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

| 薬品名 | 投与方法 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|---|---|-----|-----|----|----|-----|-----|----|---|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | 14 | 15 | ... | ... | 21 | 1 | 2 | 3 | ... | ... | 14 | 15 | ... | | | |
| オキサリプラチン | 点滴 | | | | ... | ... | | | ... | ... | | | | ... | ... | | | ... | | | | |
| エスワンタイホウ | 内服 | | | | ... | ... | | | ... | ... | | | | ... | ... | | | ... | | | | |



| | | | |
|---------|-----|------|--|
| 1クールの日数 | 21日 | クール数 | |
|---------|-----|------|--|

◆投与方法

| | 薬剤 | 用量 | 投与経路 | 投与時間・その他 | 投与日 |
|----------|----------------|--------------------------|------|---|---------|
| 1 前投薬 | 生食 | 50mL | 点滴 | 15分 | 1 |
| | アロキシ | 0.75mg | | | |
| | オルガドロソ | 3.8mg×2A | | | |
| 2 | 5%糖液 | 250mL | 点滴 | 120分 | 1 |
| | オキサリプラチン | 100~130mg/m ² | | | |
| 内服 | エスワンタイホウ (S-1) | 1日2回朝夕 | 経口 | 体表面積 <1.25 40mg×2 1.25 - 1.5 50mg×2 >1.5 60mg×2 | 1ター-15朝 |

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・オキサリプラチン：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、アレルギー反応、視覚障害、間質性肺炎
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社