


SOX+ベクティビックス (P-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん (KRAS遺伝子野生型)

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	14	15	21	1	2	3	14	15	...			
ベクティビックス	点滴						
オキサリプラチン	点滴						
エスワンタイホウ	内服						



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロ	3.8mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	60分 全量100mLに調製 *フィルター付輸液セット使用	1
	ベクティビックス	6mg/kg			
3	5%糖液	250mL	点滴	120分	1
	オキサリプラチン	100~130mg/m ²			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積 <1.25 40mg×2 1.25 - 1.5 50mg×2 >1.5 60mg×2	1ター 15朝

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・ベクティビックス：皮疹、皮膚障害、癢痒、爪囲炎、低Mg血症、下痢、間質性肺炎、インフュージョンリアクション
- ・オキサリプラチン：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、アレルギー反応、視覚障害、間質性肺炎
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社