


XELOX (CapeOX) + アバスチン (B-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	14	15	21	1	2	3	14	15	...			
アバスチン	点滴						
オキサリプラチン	点滴						
ゼローダ	内服						



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	初回90分 以降60分→30分 全量100mLに調製 *ブドウ糖溶液との配合×	1
	アバスチン	7.5mg/kg			
3	5%糖液	250mL	点滴	120分	1
	オキサリプラチン	100~130mg/m ²			
内服	ゼローダ	2000mg/m ² /日	経口	1日2回 朝・夕	1ター 15朝

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延
- ・オキサリプラチン：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、アレルギー反応、視覚障害、間質性肺炎
- ・ゼローダ：悪心、下痢、手足症候群、骨髄抑制、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社