


対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																												
		1	2	3	14	15	28	1	2	3	14	15										
イリノテカン	点滴			
エスワンタイホウ	内服			



1クールの日数	28日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1,15
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロソ	3.8mg×2A			
2	5%糖液	250mL	点滴	90分	1,15
	イリノテカン	100mg/m ²			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積 <1.25 40mg×2 1.25 - 1.5 50mg×2 >1.5 60mg×2	1タ- 15朝

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・イリノテカン：骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、間質性肺炎
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年

勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社