


S-1+アービタックス (C-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																			
		1	8	15	22	29	36	42	1
アービタックス	点滴																				
エスワンタイホウ	内服																				



1クールの日数	42日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1, 8, 15, 22, 29, 36
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
	ポラミン	5mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	初回120分 以降60分 全量250mLに調製	1, 8, 15, 22, 29, 36
	アービタックス	初回400mg/m ² 以降250mg/m ²			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積 <1.25 40mg×2 1.25 - 1.5 50mg×2 >1.5 60mg×2	1タ- 29朝

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アービタックス：皮疹、皮膚障害、痒痒、爪囲炎、下痢、低Mg血症、インフュージョンリアクション、心障害
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野おおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社