


S-1+アバスチン (B-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																			
		1	8	15	22	29	36	42	1
アバスチン	点滴																				
エスワンタイホウ	内服																				



1クールの日数	42日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	100mL	点滴	初回90分 以降60分→30分 全量100mLに調製 *ブドウ糖溶液との配合×	1, 15, 29
	アバスチン	5mg/kg			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積 <1.25 40mg x 2 1.25 - 1.5 50mg x 2 >1.5 60mg x 2	1ター-29朝

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社