

ゼロータ+アバスチン (B-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	4	15	21	1	2	3	4
アバスチン	点滴				
ゼロータ	内服				



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	100mL	点滴	初回90分 以降60分→30分 全量100mLに調製 *ブドウ糖溶液との配合×	1
	アバスチン	7.5mg/kg			
内服	ゼロータ	2000mg/m ² /日	経口	1日2回 朝・夕	1夕-15朝

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延
- ・ゼロータ：悪心、下痢、手足症候群、骨髄抑制、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社