ユーエフティ/ユーゼル＋アバスチン（B-mab）

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

Day

薬品名	投与方法	1	2	3	4	…	…	15	…	…	…	…	21	…	…	…	28	1	2	3	4	…
アバスチン	点滴					…	…		…	…	…	…		…	…	…						…
ﾕｰｴﾌﾃｨ/ﾕｰｾﾞﾙ	内服					…	…		…	…	…	…		…	…	…						…

1クール

1クールの日数	28日	クール数	

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	100mL	静注	初回90分 以降60分→30分 全量100mLに調製 ＊ブドウ糖溶液との配合×	1, 15
	アバスチン	5mg/kg			
内服	ユーエフティ	300mg/m²/日	経口	1日2～3回	1-21
内服	ユーゼル	75mg/日	経口	1日3回　食間	1-21

◆催吐リスク：　軽度

◆各薬剤の主な副作用

・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延

・ユーエフティ：下痢、肝機能障害、口内炎

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社