ロンサーフ+アバスチン(B-mab)

対象疾患名:大腸がん

◆投与スケジュール

Day

薬品名	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		 28	1	2
アバスチン	点滴																				
ロンサーフ	内服																				
								1クール							>						
1クールの日数	28日						クール数														

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日	
	生食	100mL		初回90分 以降60分→30分	1, 15	
1	アバスチン	5mg/kg	点滴	女庫00万~30万 全量100mLに調製 *ブドウ糖溶液との配合×		
内服	ロンサーフ	70mg/m²/⊟	経口	1日2回 朝・夕	1 <i>タ-</i> 6朝 8タ-13朝	

◆催吐リスク: 中等度

◆各薬剤の主な副作用

• アバスチン: 高血圧、タンパク尿、出血(消化管出血、鼻出血、歯肉出血など)、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延

・ロンサーフ:骨髄抑制、疲労、下痢、悪心、食欲不振

◆参考文献

日本癌治療学会編,制吐薬適正使用ガイドライン2015年 勝俣範之,足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社