

イリノテカン+アービタックス (C-mab)

対象疾患名：結腸・直腸がん

◆投与スケジュール

		Day																		
薬品名	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	1	2	3	4
アービタックス	点滴									
イリノテカン	点滴									



1クールの日数	14日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1, 8
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロ	3.8mg×2A			
	ポララミン	5mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	初回120分 以降60分 全量250mLに調製	1, 8
	アービタックス	初回400mg/m ² 以降250mg/m ²			
3	5%糖液	250mL	点滴	90分	1
	イリノテカン	150~180mg/m ²			

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アービタックス：皮疹、皮膚障害、痒痒、爪囲炎、下痢、低Mg血症、インフュージョンリアクション、心障害
- ・イリノテカン：骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、間質性肺炎

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社