

EC療法

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																		
		1	2	3	4	5	6	7	21	1	2	3	4	5	6	7
エピルピシン	点滴																			
エンドキサン	点滴																			



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	アプレピタントセット	初日125mg 2~3日80mg	経口	投与30分前	1-3
2 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロ	3.8mg×2A			
3	生食	100mL	点滴	15分	1
	エピルピシン	60~100mg/m ²			
4	生食	50mL	点滴	30分	1
	エンドキサン	600mg/m ²			

◆催吐リスク： 高度

◆各薬剤の主な副作用

- ・エピルピシン： 骨髄抑制、悪心、嘔吐、口内炎、脱毛、心筋障害、間質性肺炎
- ・エンドキサン： 悪心、嘔吐、間質性肺炎、出血性膀胱炎、心筋障害、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社