


weekly ドセタキセル

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

| | | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 薬品名 | 投与方法 | 1 | 2 | ... | ... | ... | 8 | 9 | ... | ... | ... | 15 | 16 | ... | ... | ... | 28 | 1 | 2 | ... | | | | | | | | | |
| ドセタキセル | 点滴 | | | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | | | ... | | | | | | | | | | |



1クール

| | | | |
|---------|-----|------|--|
| 1クールの日数 | 28日 | クール数 | |
|---------|-----|------|--|

◆投与方法

| | 薬剤 | 用量 | 投与経路 | 投与時間・その他 | 投与日 |
|----------|--------|------------------------|------|----------|----------|
| 1 前投薬 | 生食 | 50mL | 点滴 | 15分 | 1, 8, 15 |
| | アロキシ | 0.75mg | | | |
| | オルガドロン | 3.8mg×2A | | | |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴 | 60分 | 1, 8, 15 |
| | ドセタキセル | 35~40mg/m ² | | | |

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ドセタキセル： 骨髄抑制、悪心、嘔吐、脱毛、末梢神経障害、爪の変化、浮腫

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年

勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社