徳島健生病院　化学療法レジメン

ハラヴェン＋ハーセプチン（トラスツズマブ）

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

Day

薬品名	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	…	…	21	1	2	3	4	5	6	7	8	…	…
トラスツズマブ	点滴	■								…	…		■								…	…
ハラヴェン	静注	■							■	…	…		■							■	…	…

1クール

1クールの日数	21日	クール数	

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	250mL	点滴	初回90分 以後30分	1
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 以後6mg/kg			
2	生食	20mL	静注	2～5分 全量20mL程度とする	1, 8
	ハラヴェン	1.4mg/m^2			

◆催吐リスク：　軽度

◆各薬剤の主な副作用

・トラスツズマブ：インフュージョンリアクション、心障害、間質性肺炎

・ハラヴェン：骨髄抑制、脱毛、悪心、口内炎、疲労、末梢神経障害、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年

勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社