


## アブラキサン+ハーセプチン（トラスツズマブ）

対象疾患名：乳がん

### ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	4	5	6	7	...	...	...	21	1	2	3	4	5	6	7	...	...	...
アブラキサン	点滴																					
トラスツズマブ	点滴																					



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食	適量	点滴	30分 アブラキサン100mgあたり 20mLの生食で溶解する	1
	アブラキサン	180mg/m <sup>2</sup>			
3	生食	250mL	点滴	初回90分 以後30分	1
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 以後6mg/kg			

※アブラキサンはアルブミン含有のため、同意書、Lot番号の管理が必要

### ◆催吐リスク： 軽度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・アブラキサン： 骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
- ・トラスツズマブ： インフュージョンリアクション、心障害、間質性肺炎

### ◆参考文献

- 日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
- 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社