


アブラキサン+フェソロデックス

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	4	5	6	7	21	1	2	3	4	5	6	7
アブラキサン	点滴																					
フェソロデックス	筋注		*初回、2週後、4週後、その後4週ごと																			



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	オルガドロ	3.8mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	30分 アブラキサン100mgあたり 20mLの生食で溶解する	1
	アブラキサン	175mg/m ²			
3	フェソロデックス	500mg	筋注	初回、2週後、4週後、その後4週ごと	

※アブラキサンはアルブミン含有のため、同意書、Lot番号の管理が必要

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- アブラキサン：骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
- フェソロデックス：注射部位反応（疼痛、硬結、掻痒感）、ほてり、血栓塞栓症、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社