


アバスチン+アブラキサン+パラプラチン

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																							
		1	2	3	...	8	9	15	16	28	1	2	3	...	8	9			
アバスチン	点滴						
アブラキサン	点滴						
パラプラチン	点滴						



1クールの日数	28日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1, 8, 15
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
	ファモチジン	10mg×2A			
	ポラミン	5mg×2A			
2	生食	100mL	点滴	初回90分 以後60分→30分 全量100mLに調製	1, 15
	アバスチン	10mg/kg			
3	生食	適量	点滴	30分 アブラキサン100mgあたり20mL の生食で溶解する	1, 8, 15
	アブラキサン	100mg/m ²			
4	生食	250mL	点滴	60分	1, 8, 15
	パラプラチン	AUC=2			

※アブラキサンはアルブミン含有のため、同意書、Lot番号の管理が必要

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アバスチン：高血圧、タンパク尿、出血（消化管出血、鼻出血、歯肉出血など）、血栓塞栓、腸管穿孔、創傷治癒遅延
- ・アブラキサン：骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
- ・パラプラチン：悪心、嘔吐、骨髄抑制、イレウス、間質性肺炎、脱毛

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社