weekly パクリタキセル

対象疾患名：胃がん

◆投与スケジュール

Day

薬品名	投与方法	1	2	…	…	…	8	9	…	…	…	15	16	…	…	…	28	1	2	…		
パクリタキセル	点滴			…	…	…			…	…	…			…	…	…						

1クール

1クールの日数	28日	クール数	

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	レスタミンコーワ錠	10mg×5錠	経口	点滴の30～60分前	1, 8, 15
	生食	50mL	点滴	30分	1, 8, 15
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
	ファモチジン	10mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	60分	1, 8, 15
	パクリタキセル	60～80mg/m^2			

◆催吐リスク：　軽度

◆各薬剤の主な副作用

・パクリタキセル：骨髄抑制、末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、悪心、嘔吐、脱毛、アナフィラキシー、間質性肺炎

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社