


CDDP+S-1

対象疾患名：胃がん

◆投与スケジュール

		Day																																		
薬品名	投与方法	1	2	8	9	21	22	23	35	1	2														
シスプラチン	点滴																
エスワンタイホウ	経口																



1クールの日数	35日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	50mL	点滴	30分	8
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食	500mL	点滴	120分 全量500mLに調製	8
	シスプラチン	60mg/m ²			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積 <1.25 40mg×2 1.25 - 1.5 50mg×2 >1.5 60mg×2	1-21

◆催吐リスク： 高度

◆各薬剤の主な副作用

- シスプラチン：悪心、嘔吐、食欲不振、腎機能障害、骨髄抑制、聴力障害、末梢神経障害、低Mg血症
- S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社