

## パクリタキセル+サイラムザ

対象疾患名：胃がん

### ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																											
		1	2	3	...	...	8	9	10	...	...	15	16	17	...	...	...	28	1	2	3	...							
パクリタキセル	点滴				...	...				...	...				...	...	...				...				...				
サイラムザ	点滴				...	...				...	...				...	...	...				...				...				



1クールの日数	28日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	レスタミンコーワ錠	10mg×5錠	経口	点滴の30~60分前	1, 8, 15
	生食	50mL	点滴	30分	
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
	ファモチジン	10mg×2A			
2	生食	250mL	点滴	60分 全量250mLに調製 *フィルター付輸液セット使用 *ブドウ糖溶液との配合×	1, 15
	サイラムザ	8mg/kg			
3	生食	250mL	点滴	60分	1, 8, 15
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>			

◆催吐リスク： 軽度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・サイラムザ：血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、消化管穿孔、出血(特に消化管出血)、高血圧、疲労、下痢
- ・パクリタキセル：骨髄抑制、末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、悪心、嘔吐、脱毛、アナフィラキシー、間質性肺炎

### ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社