

ドセタキセル+S-1

対象疾患名：胃がん（術後補助化学療法）

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																			
		1	...	14	...	21	1	...	14	...	21	1	...	14	1	...	28	...	42
ドセタキセル	点滴		
エスワンタイホウ	経口		

1クール (21日ごと)	2~7クール (21日ごと)	8クール~ (42日ごと)
-----------------	-------------------	------------------

1クールの日数	1~7クール 21日 8クール~ 42日	クール数	手術後1年間
---------	-------------------------	------	--------

◆投与方法

【1~7クール（21日ごと）】

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日	
1 前投薬	生食	50mL	点滴	30分	1 (2~7クール)	
	アロキシ	0.75mg				
	オルガドロン	3.8mg×2A				
2	生食	250mL	点滴	60分	1 (2~7クール)	
	ドセタキセル	40mg/m ²				
内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積	1-14 (1~7クール)	
				<1.25		40mg×2
				1.25 - 1.5		50mg×2
				>1.5		60mg×2

【8クール~終了（42日ごと）】

内服	エスワンタイホウ (S-1)	1日2回朝夕	経口	体表面積	1-28 (8クール~)	
				<1.25		40mg×2
				1.25 - 1.5		50mg×2
				>1.5		60mg×2

◆催吐リスク：軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ・ドセタキセル：骨髄抑制、悪心、嘔吐、脱毛、末梢神経障害、爪の変化、浮腫
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年

勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社