

## カルセド注

対象疾患名：非小細胞肺がん・小細胞肺がん

### ◆投与スケジュール

		Day																																	
薬品名	投与方法	1	2	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28	1	2	3	...	...	...	...
カルセド	点滴				...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				...	...	...	...


  
1クール

1クールの日数	28日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	100mL	点滴	15分	1~3
	アロキシ	0.75mg			
	オルガドロン	3.8mg×2A			
2	生食 or 5%糖液	20mL	静注	緩徐に	1~3
	カルセド	45mg/m <sup>2</sup>			

◆催吐リスク： 中等度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・カルセド：骨髄抑制、悪心、嘔吐、脱毛、間質性肺炎、心筋障害

### ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社