

ゲムシタピン+S-1

対象疾患名：膵がん

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																						
		1	2	3	...	8	9	10	...	15	...	21	1	2	3	...	8	9	10			
ゲムシタピン	静注	■			...	■						■			...	■			...	
エスワンタイホウ	内服	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	100mL	静注	30分	1, 8
	ゲムシタピン	1000mg/m ²			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	80mg/m ²	経口	1日2回 朝・夕	1夕-15朝

◆催吐リスク： 軽度

◆各薬剤の主な副作用

- ・ゲムシタピン： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、発疹、間質性肺疾患
- ・S-1： 悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社