

ゲムシタビン+アブラキサン

対象疾患名：膵がん

◆投与スケジュール

| 薬品名 | 投与方法 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 1 | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | 1 | ... | ... | ... | ... | |
| ゲムシタビン | 点滴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アブラキサン | 点滴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|---------|-----|------|--|
| 1クールの日数 | 28日 | クール数 | |
|---------|-----|------|--|

◆投与方法

| | 薬剤 | 用量 | 投与経路 | 投与時間・その他 | 投与日 |
|----------|--------|-----------------------|------|---------------------------------------|-----|
| 1 前投薬 | 生食 | 50mL | 点滴 | 30分 | 1 |
| | アロキシ | 0.75mg | | | |
| | オルガドロン | 3.8mg×2A | | | |
| 2 | 生食 | 適量 | 点滴 | 30分 アブラキサン100mgあたり 20mLの生食で溶解する | 1 |
| | アブラキサン | 125mg/m ² | | | |
| 3 | 生食 | 適量 | 点滴 | 30分 | 1 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | | | |

※アブラキサンはアルブミン含有のため、同意書、Lot番号の管理が必要

◆催吐リスク： 中等度

◆各薬剤の主な副作用

- ・アブラキサン： 骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
- ・ゲムシタビン： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、発疹、間質性肺疾患

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社