

# CHOP

対象疾患名：非ホジキンリンパ腫

## ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	4	5	6	7	...	...	...	21	1	2	3	4	5	6	7	...	...	...
エンドキサン	点滴	■																				
アドリアシン	点滴	■																				
オンコビン	静注	■																				
プレドニン	内服	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■					



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

## ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
前投薬	生食	50mL	点滴	15分	1
	オンダンセトロン	4mg×1A			
2	生食	20mL	静注	5分	1
	オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup>			
3	生食	100mL	点滴	60分	1
	アドリアシン	50mg/m <sup>2</sup>			
4	ソルデム3A	200~500mL	点滴	180分	1
	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>			
5	プレドニゾロン	5mg×20錠	経口	1日1~2回にわけて	1-5

## ◆催吐リスク： 高度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・エンドキサン：悪心、嘔吐、間質性肺炎、出血性膀胱炎、心筋障害、肝機能障害
- ・アドリアシン：悪心、嘔吐、骨髄抑制、心機能障害、脱毛
- ・オンコビン：末梢神経障害、便秘、イレウス、脱毛

## ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社