


R-CHOP

対象疾患名：非ホジキンリンパ腫

◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																				
		1	2	3	4	5	6	7	21	1	2	3	4	5	6	7
リツキサン	点滴	■																				
エンドキサン	点滴		■																			
アドリアシン	点滴		■																			
オンコピン	静注		■																			
プレドニン	内服		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1 前投薬	生食	20mL	静注	リツキサン投与の1時間前	1
	ソル・コーテフ	100mg			
2 前投薬	レスタミンコーワ錠	10mg×3錠	経口	リツキサン投与の30分前	1
	アセトアミノフェン	500mg			
3	5%糖液	適量	点滴	25mL/時より開始し、 1時間後100mL/時に増量 10倍希釈に調製	1
	リツキサン	375mg/m ²			
4 前投薬	生食	50mL	点滴	15分	2
	オンダンセトロン	4mg×1A			
5	生食	20mL	静注	5分	2
	オンコピン	1.4mg/m ²			
6	生食	100mL	点滴	60分	2
	アドリアシン	50mg/m ²			
7	ソルデム3A	200~500mL	点滴	180分	2
	エンドキサン	750mg/m ²			
8	プレドニゾン	5mg×20錠	経口	1日1~2回にわけて	2-6

◆催吐リスク： 高度

◆各薬剤の主な副作用

- ・リツキサン：インフュージョンリアクション、腫瘍崩壊症候群、汎血球減少
- ・エンドキサン：悪心、嘔吐、間質性肺炎、出血性膀胱炎、心筋障害、肝機能障害
- ・アドリアシン：悪心、嘔吐、骨髄抑制、心機能障害、脱毛
- ・オンコピン：末梢神経障害、便秘、イレウス、脱毛

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社